

Zusammengehörigkeit dieser beiden ♂ erkannt habe und andererseits mit Anwendung meiner Theorie das *suspiciosus*-♀ für ein solches des *bucculentus* mit männlicher Färbung der Schienen erkläre.

Findet diese meine Theorie und die von mir gemachte Anwendung derselben Beifall, so ist die Verschiedenheit der Ansichten über die ♂ des *extensorius*, *suspiciosus* und *bucculentus* zwischen mir und Thomson ausgeglichen, wir sind dann namentlich über das ♂ einer unserer gemeinsten Arten und über gewisse Verschiedenheiten desselben im Klaren und haben einen Anhaltspunkt, der bei Beurtheilung individueller Eigenthümlichkeiten mancher anderer Arten gute Dienste leisten und selbe bedeutend erleichtern kann.

---

### Ein neuer *Carabus*,

beschrieben von Dr. Roeschke (Berlin).

Herr Rost, ein bekannter tüchtiger Sammler, hatte im vorigen Jahre in der Gebirgskette des Elburs (am Südost-rande des kaspischen Meeres) einen *Carabus* in Mehrzahl gefangen, den er als *C. Stroganowi* verschickte. Jedoch unterscheidet sich der Rost'sche *Carabus* von letzterem durch die bedeutend kleinere Form, die schmaleren, gewölbteren, regelmässig ovalen Fld. mit einer völlig verschiedenen Skulptur: glatt, punktirt-gestreift, Zwischenräume mehr oder weniger flach, 4., 8., 12. Streif kettenförmig, während bei *Stroganowi* „stries longitudinales de points enfoncés vert-métalliques, qui sont interrompues par des lignes élevées, courtes, noires, luisantes, de longueur différente“ d. h. rauh, tief punktirt-gestreift, Streifen gekerbt, theilweise durch Querrunzeln unterbrochen, also etwa die Mitte zwischen *C. caelatus* und *croaticus* haltend. Der Rost'sche *Carabus* ist also garnicht mit *Stroganowi* zu identificiren. Nach meiner Ansicht und Prüfung des einschläglichen Materials haben wir es mit einer species nova zu thun.

*Carabus Persianus* mihi. — 26—33: 6½—8 (Thor.):  
10—12½ (Elytr.) mm.

Elongato-ovatus, subconvexus, niger; supra capite prothoraceque violaceo, elytris viridibus vel aureis aut totus violaceus vel nigro-cyaneus; thorace cordato, rugoso, elytris

punctato-striatis, interstitiis subplanis et sublaevibus, trinis subaequalibus inter tres lineas punctis impressis catenatas.

Antennis nigris dimidium corporis in ♀ fere attingentibus, in ♂ parum superantibus, tenuibus, articulo tertio primo parum longiore, secundo quarto subaequali. Palpis articulo ultimo in ♂ modice securiformi, labialibus articulo penultimo 3—5-, plerumque 4-setoso. — Capite sat latiusculo, collo vix constricto; sulcis frontalibus profundis; grosse rugoso-punctato in vertice, punctato inter antennis et in genis, rugato post oculos, his modice prominulis griseis; clypeo leviter sinuato, labro magno, profunde emarginato, lobis lateralibus rotundatis productis, sinu fulvo-piloso. Mandibulis elongatis apice acutis supra punctatis. Mento laevi nec punctato nec rugoso, sinu sat profundo, dente magno sat acuto lobos laterales apice obtusos sed parum rotundatos superante. Gula leviter punctato-rugosa. Thorace cordato, disco vix convexo fere plano, longitudine parum latiore, summa latitudine ante medium, postea leviter sinuatim coarctato, rugoso-punctato, densius et fortius ad margines, raro tamen disco sublaevi, linea media distincta, apicem et basin non attingente, sed tantum transversam utriusque impressionem; margine laterali tenuiter angustequae elevato, ante angulos posticos vix explanato, his sat productis obtuse rotundatis. — Scutello parvulo triangulari lato et brevi. — Elytris in ♂ regulariter elongato-ovalibus fere parallelis, in ♀ magis ovato-acuminatis, ante apicem vix sinuatis, hoc ipso singulariter rotundato, mediocriter convexis, non profunde striato-punctatis, intervallis vix aut parum elevatis, interstitiis 4<sup>o</sup>, 8<sup>o</sup>, 12<sup>o</sup> punctis impressis catenatis, ceteris intervallis saepius tenuiter transversim rugulosis, striis ad latera et apicem dissolutis, margine distincte sed anguste explanato-elevato. — Corpore toto subtus nigro nitido, sublaevigato, punctis vel rugis vix perspicuis aut nullis. -- Pedibus nigris elongatis.

♂: Tibiis anticis magis crassatis, tarsis anticis articulis tribus primis fortiter dilatatis transversis, spongiosis. — Forcipe parum curvato apice fere recto et obtuso, leviter in convexitate ante apicem sinuato. —

Patria: In montibus Elburs Persiae in regione alpina usque ad nives perpetuas.